



Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
(SESPAS)

ENFERMEDAD
APENDICITIS

Santo Domingo, R. D.

¿QUÉ ES?

Inflamación del apéndice, un pequeño saco intestinal residual que se extiende desde el ciego.
No se conoce su función pero puede ser causa de perforación intestinal.
Afecta a 1 de cada 500 personas.
La edad más frecuente es entre los 15 y los 24 años.
Muy rara cuando se tienen menos de 2 años.

CAUSAS

La causa más frecuente estriba en la oclusión del orificio de entrada al apéndice por algún objeto; pipas de uva, trocitos de hueso,...

SÍNTOMAS

Los síntomas más característicos son:

Dolor:

Se origina en la ingle y se mueve hacia la parte derecha del abdomen.

Persistente y bien localizado.

Empeora si se mueve, tose, camina ó a la palpación.

Puede haber náuseas y vómitos, febrícula y estreñimiento.
Resistencia muscular involuntaria en la parte derecha del abdomen, que puede extenderse a todo el mismo.
Aumento de los leucocitos ó glóbulos blancos en la sangre.

FACTORES DE RIESGO

Enfermedades recientes o infecciones gastrointestinales.
Es relativamente frecuente el hallazgo de un cuerpo extraño (semilla o pipo, trozo de hueso) en el apéndice extirpado, aunque no es imprescindible.

PREVENCIÓN

No existe.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

El diagnóstico se basa en la clínica y la analítica de sangre.
Una infección urinaria puede enmascarar una apendicitis.

Medicación

NO TOMAR LAXANTES, ENEMAS, NI MEDICACIÓN ANTIDOLOR.
Sólo antibióticos si hay infección presente.
La cirugía para extirpar el apéndice es el único tratamiento.

POSIBLES COMPLICACIONES

Absceso y perforación del peritoneo (grave).

PRONÓSTICO

Bueno, si se actúa con rapidez.